

Annico (E15T.41537)

Teeltrichtlijnen



Raseigenschappen

- Resistenties:
HR: ToMV:0-2/ToANV/Ff:A-E/Fol:0,1
IR: TSWV/On/Ss/Ma/Mi/Mj | T: Si
- Kwalitatief sterk ras met uitstekende smaak.
- Zeer uniform plantmateriaal en stengelgelijkheid.
- Uniforme vlakke trossen en vruchtgrootte.
- Sterke groene delen met goede houdbaarheid.
- Snelle kleuring naar dieprood.
- Indicatie vruchtgewicht: 40-43 gram (bij 9 à 10 vruchten/tros).
- Stevige vrucht; niet gevoelig voor scheuren.
- Snelle, soepele vruchtzetting.
- Open gewastype door de horizontale bladstand.
- Vrij sterke groeier met uithoudingsvermogen.
- Zeer regelmatige plantontwikkeling.
- Sterk tegen bladrandjes.

Annico (E15T.41537)



Annico levert een hoge productie, uniformiteit in vruchtgrootte en produceert daarbij een zeer laag percentage klasse 2 vruchten.

Opkweek en onderstam

Bij de opkweek komt Annico in de tray makkelijk, snel en zeer uniform op. Wel zijn er enige aandachtspunten om rekening mee te houden. Zo rekt de plant enigszins ten opzichte van referentieras T. Daardoor ontwikkelt het ras ongeveer 10% meer lengtegroei. Houd hier rekening mee in de snelheid van opstoken naar de dag. Vanwege de relatief lichtrijke omstandigheden, is het advies om na het enten het eerste echte blad te halveren om een sterke vegetatieve inslag te vermijden. Verder is Annico een krachtige groeier. Daarom is generatief sturen erg belangrijk, zeker in de periode tot 15 september.

Annico geeft vrij makkelijk extra stengels. Vaak is dat een indicatie dat ook na het toppen de stengels goed en gelijkmatig doorkomen. Top bij voorkeur op het 3e blad voor gelijkheid en uniformiteit. Overwegend heeft 2 stengels/plant de voorkeur, maar voor plantdata tot 1 september is het ook mogelijk om met een plant met 3 stengels te starten.

Verder is Annico niet resistent tegen Verticilium. Kies daarom voor een geschikte onderstam die het beste past bij uw teeltwijze en teeltstrategie.

Stengels per m²

Momenteel is er nog te weinig teeltervaringen om specifiek advies te geven over de stengels per m². Hieronder geven we een indicatie wat naar verwachting goed bij Annico past:

Plantdata tot 25/08 (week 34)

Plant uit op 2,5 stengels/m², met een eerste trosdief naar 2,8-3,2 st/m². Dit is afhankelijk van de geïnstalleerde belichtingsinstallatie. Midden winter, bij een belichtingscapaciteit van 14.000 lux of 200 micromol/s of hoger behoort 3,2 stengels/m² tot de mogelijkheden.

Als het geen probleem is om terug te koppen, overweeg dan om met de eerste trosdief direct naar 3,75 stengels/m² te gaan. Kop rond week 38 vervolgens terug naar 2,8 à 3,0 st/m². In week 46 is de gekopte stengel dan volledig geoogst. De eindafstand ligt tussen de 3,75 en 4,0 st/m².

Plantdata 25/08 (week 34) tot 25/10 (week 43)

Plant uit op 2,5 stengels/m², met een eerste trosdief naar 2,8-3,0 stengels/m². Dit is afhankelijk van het beschikbare licht. Ga tussen week 2 en week 6 in 2 stappen naar maximaal 3,75 stengels/m².

Teelt

In de eerste maanden van de teelt groeit Annico erg makkelijk en geeft deze een fors en groot blad. Daarentegen staat de plant wel makkelijk 'op de vrucht'. Door de dikkere stengels en lange, grove bladeren wordt dit ras snel bestempeld als vegetatief. Echter, stook dit ras niet zomaar 'slank'. Dit blad en stengelvolumen onder de zettende/gezette tros is normaal in de eerste drie teeltmaanden.

Beoordeel met name de bovenste 10 cm van de plant. Let daarop dat de tros voldoende sterk en generatief is.

In vergelijking met bijvoorbeeld referentieras B blijkt uit de proeven dat Annico sneller in balans is en zich gemakkelijk evenwichtig ontwikkelt door de soepele vruchtzetting. Actief telen is het devies. Ook is ontvochtigen erg belangrijk. Steek er dus, letterlijk, voldoende energie in.

Plantbelasting

Streef generativiteit en plantbalans na door vanaf dag twee na het planten met hoge etmaal-temperaturen te werken met, indien mogelijk, een dag/nacht verschil van 6° tot 9°C. Dit valt niet altijd mee, met name in de plantingen tussen 1 mei en half september. Er is een surplus aan licht waarbij de buitengrenzen van de mogelijkheden al snel worden bereikt.

Om zo snel mogelijk plantbelasting te creëren bij plantingen tussen 1 mei en half september, is het advies om de 1e twee trossen niet te snoeien of alleen wat nabloei weg te halen.

Bij plantingen na half september verdient met name het ontvochtigen van de kas t.b.v. generativiteit veel aandacht. Een luchtig en actief klimaat is erg belangrijk in de herfst-/winterperiode. Zorg voor voldoende buisactiviteit van onderuit, zonder dat daarmee de etmaaltemperaturen stijgen.

Bij laat september- en oktoberplantingen moet de etmaaltemperatuur eerder omlaag dan men denkt. Stuur rond de 6° à 7° tros sterker op troskwaliteit en accepteer het gewasvolume. Te lang doorgaan met hoge etmaaltemperaturen om het gewas 'slank' te krijgen, resulteert namelijk vaak in zwakke trossen en een (te) laag vruchtgewicht eind december en januari.



Annico (E15T.41537)



Resultaten proeven

In geen enkele proef in de afgelopen jaren kwam Annico te zwak te staan. In verschillende teelt-regimes en naast verschillende standaardrassen, voldoet het ras goed en is het flexibel. In de donkerste perioden was de groei soms wel wat moeizaam bij hoge plantbelasting. Daarom is het verstandig om vanaf week 46-48 geen blad meer uit de kop te halen bij de vroegste plantingen.

Verder is het advies om groeizaam te telen naar het voorjaar toe door voldoende vocht te knippen en daarmee op een iets hoger temperatuurniveau te telen. Daarmee wordt de overgang van de belichte naar de onbelichte periode makkelijker.

Het productieniveau van Annico is consistent en hoog. Dit komt doordat het vruchtgewicht op niveau blijft en de plantuniformiteit zeer goed is. Er komen eigenlijk geen zwakke of achterblijvende stengels voor. De mogelijkheid om wat ruimer te snoeien en het zeer lage percentage klasse 2 dragen daar ook aan bij.

Snoeien en behandeling trossen

Tot zover komt Annico het beste tot zijn recht bij snoeien op 9 à 10 vr/tros. Dit bevordert regelmaat en balans in de productie en het behoud van een regelmatige teeltlijn.

Plant data tot week 36:

- Tros 1 en 2: Op 10 tot maximaal 12 vruchten of eventueel niet snoeien in verband met het opbouwen van de plantbelasting
- Tros 3 t/m week 38: Op 10 vruchten; dan zijn alle trossen van 10vr/tros rond week 48 weg;
- Vanaf week 38: Snoeien op 9 vruchten per tros.

Plant data week 36 - week 38:

- Tros 1 tot week 43: Op 10 vruchten of eventueel niet snoeien in verband met het opbouwen van de plantbelasting.
- Vanaf week 43: Op 9 vruchten.

Plant data week 41 - week 44:

- Tros 1: Op 10 à 11 vruchten.
- Vanaf tros 2: Op 9 vruchten.

Vanzelfsprekend wordt er in alle gevallen tros-behandeld dan wel gebeugeld; zeker tot en met week 11.

Bemesting

Er zijn nog geen specifieke aanwijzingen dat het ras speciale aandachtspunten in de bemesting nodig heeft.





enzazaden.nl

Uw contactpersonen

Edwin Bornkamp	tel +31 (0)6 21 28 20 53
Edwin van Antwerpen	tel +31 (0)6 21 80 46 91
Frank van der Spek	tel +31 (0)6 46 07 41 38
Marc Mens	tel +31 (0)6 29 06 64 54
Kris Smits	tel +32 (0)4 91 73 11 69

Enza Zaden

Postbus 7 | 1600 AA Enkhuizen | Nederland
Haling 1E | 1602 DB Enkhuizen | Nederland
tel +31 (0)228 35 01 00 | fax +31 (0)228 35 02 00
info@enzazaden.nl | www.enzazaden.nl

Deze richtlijnen zijn met de grootste zorgvuldigheid door Enza Zaden samengesteld en is onder voorbehoud van type- en/of drukfouten. De gegevens dienen in overeenstemming met de eigen kennis en ervaring van de gebruiker in samenhang met de lokale omstandigheden gehanteerd te worden. Enza Zaden kan derhalve geen aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking tot de inhoud van dit schrijven. De meest recente informatie betreffende resistenties is beschikbaar op www.enzazaden.nl

© Enza Zaden | Enkhuizen | Nederland | Januari 2021

ENZA ZADEN

